

# Durchführung der Impfung

Feststellung der Impffähigkeit und Verabreichung der Impfdosis



## 1 Impffähigkeit überprüfen

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.

Informationen zur Impffähigkeit:  
[impfzentrum.biotech.de/impfstation](https://impfzentrum.biotech.de/impfstation)



## 2 Aufklärung und Einwilligung

Mindestalter (16 Jahre),  
Kontraindikationen beachten.

Gebrauchsinformationen  
und Einwilligungs-  
erklärung



Fachinformation:  
[fachkreise.biotech.de](https://fachkreise.biotech.de)




## 3 Impfdosis vorbereiten

0,3 ml aus verdünnter Mehrfach-  
dosis-Flasche aufziehen. Auf Ver-  
färbungen oder Partikel prüfen.



## 4 Impfdosis spritzen

Intramuskulär (i. m.) in Delta-  
muskel, bis zu 6 Stunden nach  
Verdünnung.



## 5 Auf 2. Impfung hinweisen

**Wichtig:** Folgeimpfung nach  
21 Tagen notwendig, um best-  
möglichen Impfschutz ab dem  
7. Tag nach der 2. Impfung  
aufzubauen.



## 6 Impfung dokumentieren

Impfausweis oder Impfbeschei-  
nigung, ärztliche Unterschrift.



### Weitere Informationen zur Impfung

[impfzentrum.biotech.de/impfstation](https://impfzentrum.biotech.de/impfstation)



### Wichtige Hinweise

Reste des Impfstoffs dürfen nicht wieder eingefroren werden. Liegt Verdünnung mehr als 6 Stunden zurück: Durchstechflaschen mit verdünntem Impfstoff entsorgen (in Behälter für spitze und scharfe Gegenstände).



### Meldung von Nebenwirkungen

#### Kontaktinformation Pharmakovigilanz

Sie haben die Möglichkeit, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu melden:

Online: [nebenwirkungen.bund.de](https://nebenwirkungen.bund.de)

Fax: +49 6131 77-1234