

## Folgende Zielwerte wurden vereinbart:

Arzneimittelgruppe	Zielwert für DDD-Anteil der Leitsubstanzen
HMG-CoA-Reduktasehemmer (Simvastatin, Pravastatin, Atorvastatin)	97,5 %
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren (Enalapril, Lisinopril, Ramipril)	73,4 %
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten (Enalapril, Lisinopril, Ramipril, jeweils mit Diuretikum/HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin)	41,2 %
Calcium-Antagonisten (Amlodipin, Nitrendipin, Lercanidipin)	91,5 %
Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose (Alendronsäure, Risedronsäure)	80,0 %

Arzneimittelgruppe bzw. Arzneimittel	Höchstwert
HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltige Arzneimittel (Anteil von ezetimibhaltigen Arzneimitteln einschließlich Kombinationen)	5,0 %
Antidiabetika exklusive Insuline (Anteil der GLP-1-Analoga)	2,6 %
Orale Antikoagulantien (Anteil von Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban)	34,25 %
Zahl der Arzneimittel-Patienten (Anteil Patienten mit Verordnungen von Protonenpumpenhemmern) (Wert wird je Quartal ermittelt)	Hausärzte: 12,5 % Gastroenterologen: 25 % Fachärztl. Internisten ohne/sonst. SP: 10,0 %
	Mindestwert
Erythropoese - stimulierende Wirkstoffe (Anteil „biosimilarer“ Erythropoetine)	53,0 %